


KOLONOSKOPIJA

ŠTO JE KOLONOSKOPIJA?

Pretraga debelog crijeva



KAKO SE IZVODI?

Kolonoskopom tj. savitljivim endoskopskim aparatom

KADA SE IZVODI?

- po preporuci gastroenterologa
- kod pojave krvi u stolici
- kod sumnje na tumor ili upalni proces debelog crijeva
- patološki nalaz radiološke kontrastne pretrage koji zahtjeva daljnju obradu

PRIPREMA PRIJE ZAHVATA

- priprema za čišćenje (prema pisanoj uputi koju izdaje sestra prilikom upisa za pretragu)
- smanjen unos krute hrane nekoliko dana prije pretrage

DAN ZAHVATA

- ponijeti svu medicinsku dokumentaciju!
- razgovor sa sestrom (procjena Vaše upućenosti o načinu izvođenja pretrage)
- provjera dokumentacije
- provjera jeste li uzeli adekvatno sredstvo za čišćenje
- tko je došao s Vama u pratnji na dan zahvata
- zatražiti ćemo Vas pismeni pristanak

IZVOĐENJE PRETRAGE

- pretraga se izvodi na lijevom boku
- pregled započinje digitorektalnim pregledom nakon kojeg endoskopičar uvodi instrument i pregledava debelo crijevo
- tijekom pregleda može se uzeti uzorak tkiva za analizu ili ukloniti polip (nećete osjetiti bol)

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI ZA VRIJEME PRETRAGE?

- pretraga se dobro podnosi, ali učestalije uzrokuje bol podnošljivog intenziteta
- možete osjetiti pritisak, nadutost, grčeve

RIZIK POJAVA KOMPLIKACIJE NE MINIMALAN, ALI MOŽE DOĆI DO:

- krvarenja (posljedica biopsije ili polipektomije)
- perforacije (probijanja stijenke crijeva) – izuzetno rijetko

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI NAKON ZAVRŠENE PRETRAGE?

- Nalaz izvršene pretrage dobit ćete odmah, a patohistološki nalaz (biopsija ili polipektomija) s dodatnim uputama, poštom nakon 10ak radnih dana
- nakon završene pretrage možete jesti i piti ukoliko Vam liječnik ne savjetuje suprotno

Pretraga se dobro podnosi, ali ako se nakon završene pretrage i odlaska kući pojavi:

- krv u stolici
- bol u trbuhu koja ne prestaje ili se pojačava
- temperatura ili groznica

OBAVEZNO KONTAKTIRAJTE LIJEČNIKA!

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU G O R K A S O L



DVA DANA PRIJE PRETRAGE:

- između doručka i ručka popiti 30ml (1čep) sirupa DUPHALAC
- slobodno jedite laganu hranu

DAN PRIJE PRETRAGE:

- ujutro natašte popiti 30ml (1čep) sirupa DUPHALAC
- doručkovati bistru juhu, kuhani krumpir i piti što više tekućine (voda, zaslađeni čaj od kamilice)
- 13:00h popiti 2 jušne žlice gorke soli otopljene u 2dcl mlake vode
- 15:00h popiti 3 tablete DULCOLAX
- 17:00h popiti 2 jušne žlice gorke soli otopljene u 2dcl mlake vode
- tokom dana ukupno popiti minimalno 4 litre tekućine


NA DAN PRETRAGE:

- slobodno piti što više vode, čaja, soka
- ponijeti sve nalaze na pretragu

PRIJE DOLASKA NA PRETRAGU:

- **popiti 2 tablete Spasmexa**

PRIPREMA ZA KOLONOSKOPIJU MOVIPREP



DVA DANA PRIJE PRETRAGE:

- između doručka i ručka popiti 30ml (1čep) sirupa DUPHALAC
- slobodno jedite laganu hranu

DAN PRIJE PRETRAGE:

- ujutro na tašte popiti 30ml (1čep) sirupa DUPHALAC
- doručkovati bistru juhu, kuhani krumpir i piti što više tekućine (voda, zaslađeni čaj od kamilice)
- 10:00h početi piti MOVIPREP otopljen u jednoj litri vode, popiti ga kroz 1-2 sata
- 17:00 početi piti drugu dozu MOVIPREPA otopljenog u jednoj litri vode kroz 1-2 sata
- tokom dana popiti još 2 litre tekućine (ukupno s Moviprepom treba popiti 4 litre)

NA DAN PRETRAGE:

- slobodno piti što više vode, čaja, soka
- ponijeti sve nalaze na pretragu
- 2 sata prije pretrage možete jesti

PRIJE DOLASKA NA PRETRAGU:

- **popiti 2 tablete Spasmexa**